



CHU Saint-Pierre  
UMC Sint-Pieter

# CIRCONCISION



Chers parents, votre enfant a été opéré aujourd'hui d'une circoncision. Voici quelques informations pour faciliter votre retour à la maison.





## Retour à la maison de votre enfant



### CONSEILS

- Repos pendant **3 à 4 jours**.
- Activités **calmes**.
- Reprise de l'école/crèche **après 5 jours**.
- Reprise du sport **après 15 jours**.



### SOINS LOCAUX

#### QUOI ?

#### QUAND ?

##### Terra-cortril

3x/jour,  
les 3 premiers  
jours

##### Eosine aqueuse

À chaque change  
/ miction à partir  
du 4<sup>ème</sup> jour et  
jusque .....



### HYGIÈNE

- Douches tièdes à l'eau claire (**max. 5 mn**) à partir de .....
- Bains tièdes à l'eau claire (**max. 5 mn**) à partir de .....
- Laissez sécher la plaie à l'air libre.



### CE QUI PEUT ARRIVER

- **Gonflement** pendant quelques jours.
- **Petits saignements** au niveau des fils qui s'arrêteront après quelques minutes. Si ce n'est pas le cas, appuyez une compresse stérile pendant 3 minutes, à deux reprises si nécessaire.
- **Température** (38 à 38,5°) pendant deux jours.



### CONTACTER LE MÉDECIN SI

- La température dure **plus de 2 jours** ou reste élevée (39° ou plus).
- Les saignements ne **s'arrêtent pas**.
- Gonflement et/ou rougeur **excessifs**.
- Écoulement **important**/purulent.
- Douleur **non gérable** malgré les antidouleurs prescrits.

### URGENCES PÉDIATRIQUES



02/535.43.60



24h/24 - 7j/7



# Douleur

Il est indispensable de donner des anti-douleurs à votre enfant pendant 3 jours après l'intervention sans attendre qu'il ait mal.

**Donner les médicaments suivants selon le poids de votre enfant :**



## AUJOURD'HUI

### D'OFFICE

#### → PARACÉTAMOL

à ..... h .....

à ..... h .....

### SI NÉCESSAIRE

#### → IBUPROFÈNE

à ..... h .....

à ..... h .....



## DEMAIN

## + LES 2 JOURS SUIVANTS

### D'OFFICE

#### → PARACÉTAMOL (max. 4x/jour)

à 9h00

à 15h00

à 21h00

à 3h00 \*

*\* si votre enfant dort, ne le réveillez pas*

### SI NÉCESSAIRE

#### → IBUPROFÈNE (max. 3x/jour avant les repas)

à ..... h .....

à ..... h .....

à ..... h .....

Ensuite, continuez le Paracétamol **uniquement** si la douleur persiste.

## ✓ Rendez-vous post-opératoire

Une visite de contrôle est **très importante** pour s'assurer que votre enfant récupère bien.

➔ VOTRE CHIRURGIEN :

Dr .....

➔ RENDEZ-VOUS :

Le .....

à ..... h .....

sur le site .....

**En cas d'empêchement**, prévenez la consultation de pédiatrie.

**i** POUR INFORMATION, NOUS VOUS APPELLERONS LE LENDEMAIN DE L'OPÉRATION POUR PRENDRE DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT.



### Site Porte de Hal

Rue Haute 322, 1000 Bruxelles  
+32 (0)2 535 31 11  
www.stpierre-bru.be

## CONTACT

### One Day pédiatrique

 02/535.48.61

 10h-18h

### Consultation pédiatrique

 02/535.43.30

 8h-16h

### Urgences pédiatriques

 02/535.43.60

 24h/24 - 7j/7