


INFORMATION AUX PATIENTS PORTEUR D'UN *Port-a-Cath*® AVEC AIGUILLE EN PLACE



À QUOI DOIS-JE ÊTRE ATTENTIF AU NIVEAU DE MON CATHÉTER/ PANSEMENT ?

- Vérifiez le pansement régulièrement. Il doit bien coller et doit **rester sec**. Le point d'insertion de l'aiguille doit également rester propre (absence de rougeur, suintement, ...).
- Vérifiez s'il n'y a **pas de sang** dans le cathéter.
- Vous ne devez pas avoir de **douleur** ou de **gonflement** au site d'insertion.

QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE RETRAIT ACCIDENTEL DE L'AIGUILLE ?



- Ne **remplacez/remfoncez jamais** vous-même une aiguille.
- Posez un pansement **stérile**.
- **Contactez votre ICSO** et rendez vous à l'hôpital (aux urgences si week-end ou soirée/nuite).

Si un **événement inhabituel**, un malaise (gonflement du bras, sensation de gonflement du cou, un inconfort en position couchée, ...) survient ou si quelque chose vous inquiète, vous pouvez prendre contact avec votre ICSO (infirmière coordinatrice de soins en oncologie) ou le service oncologie.

ICSO

- ROUATBI Jamila **02/5354731**
- NKONE NDJOH Muriel **02/5353744**
- TIATRO Assma **02/5354221**

Contact

- Hôpital de jour **02/5354085**
- Unité d'oncologie **02/5353826**
- Urgences **02/5354065**