




CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter

IMPLANTEERBARE POORTKATHETER PAC[®]



**Deze brochure vertelt u alles wat u
moet weten over uw implanteerbare
poortkatheter (Port-a-Cath[®]).**



Wat is een implanteerbare poortkatheter (PAC) ?

Er wordt een katheter ingeplant in een van de bloedvaten, meestal ter hoogte van het sleutelbeen. De katheter wordt verbonden met een reservoir, die vervolgens onder de huid wordt geplaatst. De geneesmiddelen worden toegediend door middel van een speciale naald die door de huid en de scheidingswand van het reservoir gaat. Zo komen ze terecht in de bloedbaan.

Waarom heb ik een poortkatheter nodig?

Met een poortkatheter, een zogeheten Port-a-Cath® (PAC), hoeft u zichzelf niet meer rechtstreeks aan te prikken in een ader voor elke injectie of elk infuus van uw geneesmiddelen.

De PAC **hindert u niet** bij uw dagelijkse bezigheden en is zo goed als **onzichtbaar**.

Hoelang u uw PAC moet houden, hangt vooral af van uw behandeling.

Plaatsing van een PAC

1 VÓÓR DE PLAATSING

Leggen de arts en de verpleegkundigen u de voordelen en het verloop van de plaatsing uit. Er is ook een consultatie bij



de anesthesist gepland. Stel de arts al uw vragen over de PAC en vertel ze er zeker over als u:

een **sport** beoefent

geneesmiddelen voor het hart neemt

Waar? Meestal in het **dagopname** (geen overnachting) in de operatiekwardier.

Hoe? Meestal **onder plaatselijke verdoving** uitgevoerd door een anesthesist.

Duur: Minder dan een uur. U blijft ten minste 1 uur onder observatie in het dagziekenhuis.

2 NA DE PLAATSING

Mag u terug naar huis. U laat zich het best **door iemand vergezellen**.

Het is **normaal** dat u de eerste dagen na de plaatsing wat **pijn** of **ongemak** ter hoogte van de plaats van de PAC voelt. In de eerste week is een blauwe of rode verkleuring rond die plaats normaal. Uw arts zal u een pijnstiller voorschrijven. U neemt die in wanneer dat nodig is. **De pijn houdt zelden langer dan de eerste week aan.**

3 VERZORGING

Genezing: Na plaatsing wordt het gebied gedurende 1 week afgedekt met een verband.

Hygiëne: Douchen is toegestaan 48 uur na de plaatsing, **op voorwaarde** dat er geen naald in de PAC zit en dat u het verband na het douchen verandert.

Vervang een vuil verband.

Activiteiten: U kunt uw gebruikelijke activiteiten hervatten zodra de wonde genezen is.

! Zaken waar u thuis op moet letten

Maakt u zich zorgen of vertoont u een van de volgende symptomen?

Tekenen die kunnen wijzen op het begin van een infectie:

- koorts, rillingen of een gevoel van onbehagen
- uitvloeit rondom de aanprikplaats
- pijn, zwelling en/of roodheid rond de plek van de PAC

NEEM ONMIDDELIJK CONTACT OP MET UW CVOZ

Gebruik van het PAC

Het kan **meteen na de plaatsing worden gebruikt**. De verpleegkundige krijgt toegang via een naald die door de huid gaat. Als een behandeling van meerdere dagen nodig is, blijft de naald zitten voor de duur van de behandeling. We spreken dan van een « **open** » PAC. De naald wordt elke 7 dagen vervangen.

Ten minste 1 uur voor de punctie kan een verdovende crème worden aangebracht.

Tijdens de perioden waarin u geen behandeling krijgt, zit er geen naald in de PAC. We hebben het dan over een « **gesloten** » PAC. De PAC vereist dan **specifieke zorg**.

In het geval van complicaties (infecties, enz.) is behandeling met antibiotica noodzakelijk.

Situaties die het risico op infectie verhogen:

- het verband is losgekomen (de aanprikplaats wordt niet meer afgedekt)
- het afsluitdopje is per ongeluk verloren gegaan of gevallen
- Onopzettelijke verwijdering van de naald

U mag geen douche of bad nemen wanneer er een naald in de PAC zit.

Rode huid onder het verband kan wijzen op **een allergie** en moet door uw arts of verpleegkundige onderzocht worden.



CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter

Campus Hallepoort

Hoogstraat 322, 1000 Brussel

+32 (0)2 535 31 11

www.stpierre-bru.be

Contactpersoon

CVOZ:

 Jamila ROUATBI	 02 535 47 31
 Muriel N. NDJOH	 02 535 37 44
 Assma TIATRO	 02 535 42 21
 Soumia ETBAZ	 02 506 70 40
 Brigitte TUMUKUNDE	 02 506 70 40

 PLANIFICATIE	 02 535 49 06
 DAGZIEKENHUIS	 02 535 49 29
 ONCOLOGIE	 02 535 49 04
 SPOEDGEVALLEN	 02 535 40 65