




CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter

BEHANDELING VAN SPATADERS MET SCLEROTHERAPIE



U hebt last van spataders en er werd u een behandeling met sclerotherapie voorgesteld. Deze brochure geeft u alle uitleg over de behandeling, maar onze teams blijven tot uw beschikking voor alle aanvullende informatie die u nodig hebt.



U hebt spataders, d.w.z. een permanente verwijding van de oppervlakkige aders van de benen, veroorzaakt door slecht functionerende veneuze kleppen. Spataders kunnen leiden tot symptomen zoals pijn, krampen, een zwaar gevoel of vermoeidheid in de benen, maar ook tot complicaties zoals flebitis, bloedingen of zweren.



Wat is sclerotherapie?

Sclerotherapie is een medische behandeling die wordt gebruikt om spataders en ontsierende aders te verwijderen. Hierbij wordt **een scleroserend middel** in de betreffende ader **geïnjecteerd**, waardoor deze geleidelijk dichtgaat en door het lichaam wordt opgenomen.

Er zijn twee soorten sclerotherapie:

- ➔ **Vloeibare sclerotherapie**, gebruikt voor kleine aders
- ➔ **Foamsclerotherapie**, geschikt voor grotere spataders.



CONTRA-INDICATIES

Sclerotherapie wordt niet aanbevolen in de volgende gevallen:



Zwangerschap of borstvoeding




Recente voorgeschiedenis van diepveneuze trombose




Actieve huidinfectie in het te behandelen gebied



Als u vragen hebt of bezorgd bent, aarzel dan niet om met uw arts te spreken





Hoe verloopt de sessie?

- 1 De behandeling wordt uitgevoerd tijdens een consultatie, zonder verdoving.
- 2 Er worden een of meer injecties rechtstreeks in de ader gegeven.
- 3 U kunt licht ongemak of een tintelend gevoel ervaren.
- 4 Compressie (drukverband of compressiekousen) wordt aanbevolen na de sessie en gedurende 48 uur na de scleroserende injectie.

i Er kunnen meerdere sessies nodig zijn, afhankelijk van hoe groot de spataders zijn.



En daarna?

Behandelde spataders verdwijnen geleidelijk over een periode van **enkele weken tot enkele maanden**.

AANBEVELINGEN



30 MIN./D

Wandel zonder u te forceren, om de bloedsomloop te stimuleren



6-12 W

Vermijd blootstelling aan de zon of uv-stralen om pigmentvlekken te voorkomen

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN



Roodheid of **hematomen** op de injectieplaats



Tijdelijke **pigmentatie** van de huid



Tijdelijk **zwaar** of **ongemakkelijk** gevoel



(zeldzaam) **Allergische** reacties of **vasculaire** complicaties



**CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter**

Campus Hallepoort

Hoogstraat 322, 1000 Brussel
+32 (0)2 535 31 11
www.stpierre-bru.be

CONTACT

VASCULAIRE CHIRURGIEDIENST

**AFSPRAAK
SECRETARIAAT**

 02/535.36.39

 02/535.34.94

of 02/535.37.24