



CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter



cityplanning

METHODE VIA GENEESMIDDELEN

VRIJWILLIGE ONDERBREKING VAN DE ZWANGERSCHAP (ABORTUS)



De medicatie die je hebt gekregen, start een proces dat lijkt op een miskraam. Hieronder vindt u hoe u ze kunt gebruiken en welke maatregelen u moet nemen.

FOLLOW-UP AFSpraak MET DR.

Op:/...../..... om uur





Medicamenteuze abortus: hoe werkt het?

Je hebt ontvangen:



1 TABLET MYFEGYN® 200 MG

Myfegyn® blokkeert progesteron, een hormoon dat essentieel is voor de voortzetting van de zwangerschap, en maakt de baarmoeder ontvankelijker voor Cytotec®.



6 TABLETTEN CYTOTEC® 200 MG

Cytotec® zorgt ervoor dat de baarmoeder samentrekt, waardoor de zwangerschap, stolsels en bloedingen worden uitgedreven.



TABLETTEN VAN EEN PIJNSTILLER

- Dafalgan® forte 1g
- Cataflam® 50 mg
- Tradonal® odis 50 mg
- Buscopan® 10 mg



1 TABLET XANAX® 0,5 MG

Xanax® is een anxiolyticum dat je helpt te ontspannen voordat de procedure begint.

⚠ Begin niet met de behandeling voordat de resultaten van jouw bloedonderzoek bekend zijn.



Hoe gebruik je de medicatie?

BEHANDELING 1 / /

MYFEGYN®

om uur



Als je je misselijk voelt, kun je een middel tegen de misselijkheid nemen. Als je de Myfegyn® binnen het daaropvolgende uur uitbraakt, neem dan contact op met City Planning (02/535 50 01).

BEHANDELING 2 / /



DAFALGAN® FORTE 1G

om uur



CATAFLAM® 50 MG

om uur



½ XANAX®

om uur



CYTOTEC® VAGINAAL

om uur

Was je handen en breng de 4 tabletten na elkaar in, zo ver mogelijk in de vagina.



BUSCOPAN® 10 MG

om uur



CYTOTEC® MOND

om uur



Wat als de pijn aanhoudt?

OPTIONEEL

..... / /



TRADONAL® ODIS 50 MG

OM ONDER DE TONG TE ZUIGEN



½ XANAX®



Je kunt zeker een warmwaterkruik op je buik leggen, ontspannende muziek luisteren of een andere activiteit doen die je ontspant.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Cytotec® kan veroorzaken:



MISSELIJKHEID, BRAKEN



DIARREE



KOORTS, RILLINGEN



HOOFDPIJN

Die bijwerkingen zijn **niet gevaarlijk** en verdwijnen na een paar uur.



Wanneer treedt de bloedingen op?

De bloedingen beginnen over het algemeen **1 tot 3 uur** na het inbrengen van de tabletten Cytotec®. Je kunt intensere krampen en bloedingen ervaren dan tijdens je menstruatie.



Hoe snel werkt de behandeling?

Bij 80 % van de vrouwen wordt de zwangerschap binnen **2 tot 5 uur** na het inbrengen van de Cytotec® uitgedreven, maar het kan **tot 48 uur** duren .



Symptomen en complicaties



OVERMATIGE BLOEDINGEN

2 volledige maandverbanden voor de nacht per uur gedurende meer dan 2 tot 3 uur na elkaar



HOGЕ KOORTS

> 38-39°C gedurende meer dan 24 uur



ERNSTIGE PIJN

- niet beter wordt met pijnstillers
- enkele dagen aanhoudt na het innemen van geneesmiddelen



ABNORMALE, VIES RUIKENDE VAGINALE AFSCHEIDING

Als je symptomen hebt van een van de onderstaande complicaties, neem dan telefonisch contact met ons.





Wat gebeurt er na de abortus?

Elke vrouw reageert anders, maar je kunt 1 tot 3 weken blijven bloeden.

⚠ Sommige zwangerschapstests blijven nog 3-4 weken na een geslaagde abortus positief. Je kunt ook nog enkele weken gespannen borsten hebben.

Je kunt onmiddellijk na een abortus ook weer zwanger worden. Om een ongewenste zwangerschap te voorkomen, kun je anticonceptie gebruiken.



Welke anticonceptie?



CONDOOM

Te gebruiken zodra u weer seksuele betrekkingen heeft



PIL, IMPLANTAAT, PRIKPIL EN PATCH

Onmiddellijk na de abortus



RING

In de 5 dagen na de abortus



SPIRAALTJE

Op afspraak tijdens een consultatie in de weken na de abortus



**CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter**

Campus Hallepoort

Hoogstraat 322, 1000 Brussel
+32 (0)2 535 31 11
www.stpierre-bru.be



Hoe weet je of de methode heeft gewerkt?

95 tot 98 % van de medische abortussen is succesvol; in de andere gevallen is een andere behandeling of een extra medische ingreep nodig. Een afspraak wordt voorgesteld om te bevestigen dat de methode heeft gewerkt. Het is ook een kans om met een lid van het planningsteam te praten.

CONTACT

MAANDAG - VRIJDAG

Bel City Planning op 02/535.50.01.

AVOND / WEEKEND

Ga naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp of bel 02/535.43.13.